

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СПИХ» ОП №2

г. Нижневартовск

Меджилова И.С.

«01» августа 2025г.

ИНФОРМАЦИЯ
О СРОКАХ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

№ пп	Вид медицинских услуг	Срок ожидания предоставления услуг
1	Первичная доврачебная медико-санитарная помощь по сестринскому делу	До 1 месяца
2	Консультации врачей-специалистов	До 14 дней
3	проведения диагностических инструментальных исследований	До 14 дней
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СЦЛХ» ОП №2

г. Нижневартовск

Меджидова И.С.



ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СВЯЗАННЫХ С НИМИ РИСКАХ, ВИДАХ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Возможные риски и осложнения, сопутствующие вмешательству (*комбинированному лечению варикозной болезни, включая эндовенозную лазерную коагуляцию*), которые могут развиться вовремя или сразу после медицинского вмешательства, в том числе:

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Некроз кожи и подкожно-жировой клетчатки;
- Воспаление подкожных вен, лимфорея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематом;
- Повреждение нервов, ожоги кожи, повышении температуры до 38° до 7 дней;
- Возникновение артериовенозной фистулы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Термоиндуцированный тромбоз;
- Аллергические реакции на вводимые препараты и/или местные анестетики;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоза, летального исхода.
- Жжение – зуд кожи, в области манипуляций;
- Гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- Дыхательные нарушения: затруднение вдоха, тяжесть за грудной, кашель, чувство саднения, жжения в дыхательных путях;
- Неврологические нарушения: мигреноподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- Флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства, которые исчезают через 2-12 месяцев;
- В редких случаях через 2-4 недели после лечения по ходу склерозированной вены может появиться тонкая красноватая сосудистая «сетка», обычно самостоятельно исчезающая в течение 4-6 месяцев.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СЦЛХ» ОП №2
г.Нижневартовск

Меджидова И.С.



«01» августа 2025 г.

**РЕЖИМ
РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

День недели	Время работы	Обеденный перерыв
Понедельник	С 8.00 до 20.00	Без перерыва и выходных
Вторник	С 8.00 до 20.00	Без перерыва и выходных
Среда	С 8.00 до 20.00	Без перерыва и выходных
Четверг	С 8.00 до 20.00	Без перерыва и выходных
Пятница	С 8.00 до 20.00	Без перерыва и выходных
Суббота	С 8.00 до 20.00	Без перерыва и выходных
Воскресение	С 8.00 до 20.00	Без перерыва и выходных