

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СЦЛХ»

Юридический адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Партизана Железняка, д. 26А, помещение 78

Адрес филиала: 628602, ХМАО-Югра АО, г. Нижневартовск,

ул. Чапаева, д.6, помещение 1008

Нелаева Т.Н.



ДАТА 06.02.2025г.

ИНФОРМАЦИЯ

**О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ
ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ
ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА, ИЛИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СТАНОВЯТСЯ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.**

Номер	результат оказания медицинских услуг, выполнения работ	правила, условия сохранения эффективно го и безопасного результата лечения	Гарантийный срок на достигнуты й лечебный результат	Необходим ые действия по истечению гарантийно го срока результата лечения	возможные последствия бездействия при истечении гарантийного срока результата лечения
1	Микропенная склеротерапия, микросклеро- терапия	исключение солнечного загара, посещения	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	увеличение количества ТАЭ, внутрикожных ретикулярных вен

соляриев,
саун и бань
в течение 3
месяцев
после
последней
процедуры,
ограничение
подъема
тяжестей до
10 кг,
ношение
компрессион
ного белья.

- | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|--|
| 2 | Стволовая склеротерапия | <p>исключение 6 месяцев</p> <p>солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников</p> | <p>повторная процедура при наличии показаний</p> | <p>появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов,
примечание 1*</p> |
| 3. | ЭВЛК | <p>исключение 12 месяцев</p> <p>солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение</p> | <p>повторная процедура при наличии показаний</p> | <p>появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов,
примечание 2*</p> |

		компрессионного белья, прием флеботоников.		
		Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде		
4	«Тотал» - ЭВЛК	Исключение 12 месяцев посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников.	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*
		Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде		
5	Минифлебэктомия	Исключение 12 месяцев посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья,	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*

прием
флеботонико
в.
Соблюдение
лечебно-
охранительн
ого режима в
послеоперац
ионном
периоде

Примечание 1*

- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- неврологические нарушения: мигренеподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- симптоматический тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия с вероятным развитием летального исхода.

Примечание 2*

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематомы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоза, эмболии,
- летального исхода.